



Radiant
Health Centers
Compassionate Care for All

¿Cómo sé si PEP es adecuado para mí?

- Si has estado expuesto al VIH durante el sexo (es decir, el condón se rompió o no se utilizó condón)
- Si has compartido agujas durante drogas inyectadas.
- Si has sido agredido sexualmente

* Las personas pueden ser expuestas al VIH al entrar en contacto con ciertos fluidos corporales de una persona que vive con VIH. Estos fluidos incluyen: sangre, semen y fluidos vaginales o rectales. Esto generalmente ocurre durante del sexo vaginal o anal o al compartir agujas durante el uso de drogas inyectadas.

¿Qué es el PEP?

PEP significa Profilaxis PostExposición. PEP es una serie de píldoras que puedes empezar a tomar rápidamente luego de haber estado expuesto al VIH y reduce las probabilidades de contagio. PEP debe de tomarse dentro de las primeras 72 horas, o 3 días, luego de la exposición al VIH, sino no funcionará. Cuanto antes empieces, mejor funcionará - cada hora que pasa es importante.

¿Qué pasa cuando vas a la sala de emergencias o con tu proveedor de salud?

- El PEP debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas después del momento en que pudo haber sido expuesto al VIH. Es recomendable tomar acción de inmediato.
- Te harán un análisis de sangre para detectar el VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS) u otras pruebas necesarias.
- Si su proveedor de atención médica le receta PEP, deberá tomarlo una o dos veces al día durante 28 días.
- Es posible que deba hacer una cita para dar seguimiento con su proveedor médico después de los 28 días.

www.cdc.gov/hiv/basics/pep.html

LLÁMANOS: 949-491-1882

www.radianthealthcenters.org/services/pep